



	Depositi di terra in evoluzione Accumuli di materiale argilloso di recente deposito, dalle dimensioni da blocchi alle argille, con contenuto in materia organica variabile, tracce di drenaggio sporigo con evidenze di rivasamento recente.
	Depositi di terra senza indizi di evoluzione Accumuli di materiale argilloso di recente deposito, dalle dimensioni da blocchi alle argille, con contenuto in materia organica variabile, tracce di drenaggio sporigo con evidenze di rivasamento recente.
	Depositi di terra antica Accumuli di materiale argilloso di recente deposito, dalle dimensioni da blocchi alle argille, con contenuto in materia organica variabile, tracce di drenaggio sporigo con evidenze di rivasamento recente.
	Depositi di sabbia Accumuli di sabbie e ghiaie di provenienza fluviale, con contenuto in materia organica variabile, tracce di drenaggio sporigo con evidenze di rivasamento recente.
	Coltri calcareo-argillose Accumuli di sabbie e ghiaie di provenienza fluviale, con contenuto in materia organica variabile, tracce di drenaggio sporigo con evidenze di rivasamento recente.
	Dreni di fango Accumuli di fango e argille di provenienza fluviale, con contenuto in materia organica variabile, tracce di drenaggio sporigo con evidenze di rivasamento recente.
	Substrato di fanghina (M1) Substrato di fanghina di provenienza fluviale, con contenuto in materia organica variabile, tracce di drenaggio sporigo con evidenze di rivasamento recente.
	Substrato di fanghina (M2) Substrato di fanghina di provenienza fluviale, con contenuto in materia organica variabile, tracce di drenaggio sporigo con evidenze di rivasamento recente.
	Substrato di fanghina (M3) Substrato di fanghina di provenienza fluviale, con contenuto in materia organica variabile, tracce di drenaggio sporigo con evidenze di rivasamento recente.
	ANELLE AZZURRE Formazione di anelli azzurre di provenienza fluviale, con contenuto in materia organica variabile, tracce di drenaggio sporigo con evidenze di rivasamento recente.
	FORMAZIONE GESSOSO-SOLFIFERA Formazione di gesso e solfite di provenienza fluviale, con contenuto in materia organica variabile, tracce di drenaggio sporigo con evidenze di rivasamento recente.
	ANELLE DI CASA I GESSI Formazione di anelli di gesso di provenienza fluviale, con contenuto in materia organica variabile, tracce di drenaggio sporigo con evidenze di rivasamento recente.
	FORMAZIONE DI ACQUAVIVA Formazione di acquaviva di provenienza fluviale, con contenuto in materia organica variabile, tracce di drenaggio sporigo con evidenze di rivasamento recente.
	FORMAZIONE DI MONTE FUMAIUOLO Formazione di monte fumaiuolo di provenienza fluviale, con contenuto in materia organica variabile, tracce di drenaggio sporigo con evidenze di rivasamento recente.
	FORMAZIONE DI SAN MARINO Formazione di san marino di provenienza fluviale, con contenuto in materia organica variabile, tracce di drenaggio sporigo con evidenze di rivasamento recente.
	FORMAZIONE DI MONTE MORELLO Formazione di monte morello di provenienza fluviale, con contenuto in materia organica variabile, tracce di drenaggio sporigo con evidenze di rivasamento recente.
	ANELLE VANCIOLE Formazione di anelli vanciole di provenienza fluviale, con contenuto in materia organica variabile, tracce di drenaggio sporigo con evidenze di rivasamento recente.

